


الدرس العملى العاشر



زراعة التوت

الخطوة الأولى لتحديث إنتاج الحرير ، هي شجرة التوت (الغذاء الوحيد لديدان الحرير) ، بالاعتماد على الأصناف الجديدة

معدلات إنتاج الأوراق:

تختلف الكميات التي يمكن الحصول عليها من الأوراق حسب طبيعة أو حجم الشجرة وكذلك ميعاد جمع الأوراق ، فمن المعروف أن أعلى إنتاج للأشجار هو في موسم الربيع ثم تقل هذه الكمية خلال موسم الصيف والخريف؛ فتعطي الشجيرة (الزراعة الحقلية). متوسط إنتاج ٢ كيلو خلال موسم الربيع ، بينما يكون المعدل ١.٥ كجم خلال موسمي الصيف والخريف وتختلف الكمية حسب حجم الشجرة أو الشجيرة كالاتي:

كمية الأوراق الناتجة	عمر الشجرة
٤ كيلو	٣ سنوات
٢٧ كيلو	٦ سنوات
٤٨ كيلو	٩ سنوات
٦٩ كيلو	١٢ سنوات
٨٤ كيلو	١٥ سنوات
٩٤ كيلو	١٨ سنوات
١٠٠ كيلو	٢٠ سنوات



مزارع توت