


اعداد الاستاذ الدكتور حسام عبد النبي من خلال الاستحداث بالمواافق المختلفة على شبكة الانترنت


الفول الرومى



اعداد د/حسام السعيد عبد النبي



اعداد د/حسام السعيد عبد النبى



Region of origin: Region of cultivation:

Country	Production (1000t)		Yield (dt/ha)	
	1979-81	1992	1979-81	1992
China	2630	2500	11.6	14.7
Ethiopia	480	280	14.5	11.6
Egypt	220	390	21.3	23.8
Morocco	100	70	5.6	3.1
Germany	28	56	27.0	31.0
World	4295	4070	11.6	13.5



اعداد د/حسام السعيد عبد النبي



إعداد د/حسام السعيد عبد النبي



إعداد د/حسام السعيد عبد النبي




إعداد د/حسام السعيد عبد النبي



إعداد د/حسام السعيد عبد النبى




إعداد د/حسام السعيد عبد النبي



Frozen Broad
Bean

إعداد د/حسام السعيد عبد النبي



إعداد د/حسام السعيد عبد النبي



إعداد د/حسام السعيد عبد النبى



إعداد د/حسام السعيد عبد النبي



Magnesium deficiency
Central intervenal
chlorosis, margins green.




Phosphorus deficiency
Stems thin, leaves
erect; early defoliation
of basal leaves.



Calcium deficiency

Young growth deformed, young stems and petioles wilt and growing points die; leaflets near growing points fail to expand, distorted and hooked, and tips die.



Calcium deficiency
Pods deformed, wilted
and blackened; seeds
fail to develop.



Potassium deficiency
Internodes short; leaves
dark brown marginal scorch
and margins curled
forward.



Manganese deficiency
Brown lesions in
centers of cotyledons,
similar "Marsh Spot" in
peas.



Boron deficiency
Stems somewhat stiff;
growing points die and lateral
growths develop from bases
of shoots; leaves slight
intervenal chlorosis.



good nodules on beans root



Mexican Bean Beetle

إعداد د/حسام السعيد عبد النبى



إعداد د/حسام السعيد عبد النبي



Broad bean seed beetle

إعداد د/حسام السعيد عبد النبي